SÍNTESE QUÍMICA DE ÁCIDO MÁLICO COM O CATALISADOR MONTMORILONITA K10

ANNELORIE MATTAR KNESEBECK⁽¹⁾; RONALD WBEIMAR PACHECO ORTIZ⁽²⁾; EVERTON FERNANDO ZANOLO⁽¹⁾
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

1 – Universidade Federal do Paraná – UFPR; 2 – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

* Autor correspondente: annemattar@gmail.com

INTRODUÇÃO

O ácido málico (M, C₄H₆O₅) se apresenta na forma de dois isômeros (*d* e *l*), sendo apenas o ácido *l*-málico encontrado na natureza. Sua maior aplicação se encontra na indústria de alimentos e bebidas⁽²⁾. É amplamente utilizado como acidulante, possuindo propriedades semelhantes às dos ácidos cítrico e tartárico⁽⁶⁾. A produção de M se dá através de duas rotas principais: bioquímica e química. A primeira utiliza a enzima fumarase e é enantiosseletiva, originando apenas o isômero *l*⁽⁴⁾. Já a rota química produz a mistura racêmica, que pode ser empregada na maioria das aplicações, inclusive na indústria de alimentos e bebidas⁽²⁾. Ela consiste na hidratação do ácido fumárico (F) a altas pressões e temperaturas (R1), usualmente catalisada por ácidos fortes⁽³⁾. A desvantagem da síntese química é a ocorrência da reação secundária de isomerização de F gerando o subproduto indesejável ácido maleico (Mx, R2). Entretanto, por apresentar menor custo e maior rendimento, essa é a rota mais utilizada para produção de M em larga escala⁽⁷⁾. Os estudos existentes na literatura até o momento tratam da catálise homogênea da reação de hidratação de F, o que justifica a importância de se estudar o uso de um catalisador sólido na síntese química de M.

OBJETIVOS

Os objetivos principais deste trabalho são avaliar a eficácia de um catalisador sólido com características ácidas (Montmorilonita K10) no sistema e desenvolver um modelo cinético que represente o sistema não-catalítico, ajustando os parâmetros cinéticos e de equilíbrio correspondentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

As reações foram feitas em um reator batelada (Parr Instrument Company, modelo 4848) com capacidade de 50 mL, controle de temperatura e de velocidade de agitação. Foram feitas reações com e sem catalisador em quatro temperaturas diferentes (448, 463, 478 e 493 K), sendo cada curva cinética composta por seis pontos experimentais (0 a 600 min). A análise dos resultados foi feita por análise cromatográfica (Waters, modelo *Acquity* UPLC *H-Class*). O modelo cinético das reações não-catalíticas é descrito pelas equações 1 a 3. Cada constante de velocidade k_i é descrita pela Equação de Arrhenius (equação 4) e as constantes de equilíbrio K_i pela Equação de Van't Hoff integrada e simplificada (equação 5)⁽¹⁾. O ajuste do modelo foi feito utilizando o função *fmincon* do Matlab®, sendo a função objetivo minimizada descrita pela soma do quadrado dos erros.

$$\begin{cases} \frac{dC_F}{dt} = -k'_1 C_F + \frac{k'_1}{K_1} C_M - k_2 C_F + \frac{k_2}{K_2} C_{Mx} & (1) \\ \frac{dC_M}{dt} = k'_1 C_F - \frac{k'_1}{K_1} C_M & (2) \\ \frac{dC_{Mx}}{dt} = k_2 C_F - \frac{k_2}{K_2} C_{Mx} & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_i = k_{i,0} \exp\left(\frac{-E_{a_i}}{RT}\right) & (4) \\ K_i = K_{i,298} \exp\left[\frac{-\Delta H_{i,298}^0}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298}\right)\right] & (5) \end{cases}$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. FOGLER, H. S. **Elementos de Engenharia das Reações Químicas**. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
2. GOLDBERG, I.; ROKEM, J. S.; PINES, O. Organic acids: old metabolites, new themes. **Journal of Chemical Technology & Biotechnology**, v. 81, p. 1601–1611, 2007.
3. MATTAR KNESEBECK, A.; ORTIZ, R. W. P.; CARDOZO-FILHO, L.; ZANOLO, E. F. Isomerization and hydration of fumaric acid under catalytic and noncatalytic conditions. **Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis**, <https://doi.org/10.1007/s11144-018-1458-1>, 2018.
4. ORTIZ, R. W. P.; BENICÁ, C.; CARDOZO-FILHO, L.; ZANOLO, E. F. High-Pressure Acid-Catalyzed Isomerization and Hydration of Fumaric Acid in a Homogeneous Nonisothermal Batch Reactor. **Industrial and Engineering Chemistry Research**, v. 56, n. 14, p. 3873–3879, 2017.
5. TREMILIOSI, G. C. **Estudo Comparativo de Catalisadores Ácidos para a Produção de Biodiesel**. 2009. Universidade de São Paulo - USP, 2009.
6. **Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry**. 7th. ed. Wiley-VCH, 2011.
7. ZHENG, L. **Preparation process of malic acid**, CN1560016A, 2006.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na figura 1 estão representados os valores de conversão de F medidos experimentalmente representando a reação não-catalítica e a catalisada pela K10. A figura 2 apresenta as concentrações de F e M do sistema não-catalítico medidas experimentalmente e o modelo cinético obtido. Foram reportadas apenas a menor e maior temperatura avaliadas, pois todas as curvas seguiram a mesma tendência. Os parâmetros encontrados foram: $k_{1,0}=9,99 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$; $E_{a1}/R=6225 \text{ K}$; $k_{2,0}=0,106 \text{ s}^{-1}$; $E_{a2}/R=4997 \text{ K}$; $K_{1,298}=45,53$; $\Delta H_{1,298}/R=-2644 \text{ K}$; $K_{2,298}=0,005$; $\Delta H_{2,298}/R=25575 \text{ K}$.

Figura 1. (a) Conversão catalítica e não-catalítica de F em 448 K; (b) Conversão catalítica e não-catalítica de F em 493 K.

Figura 2. (a) Perfil de concentração de F e M em 448 K; (b) Perfil de concentração de F e M em 493 K.

Legenda: o - Valores experimentais; — modelo.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que a Montmorilonita K10 apresentou atividade catalítica no sistema, visto que para todas as temperaturas a conversão de F foi maior quando comparada às reações não-catalíticas. Portanto, é justificado o interesse em continuar a se estudar esse catalisador como alternativa para a síntese química de M. Quanto ao modelo cinético, ele representou de forma satisfatória os pontos experimentais, sendo o menor valor de R² obtido 0,9222 para o gráfico de concentração de F a 463 K.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.